

# Betadine® Desinfectiezalfgaas

## Samenstelling:

Wondgaas plus Betadine zalf (100 mg/g povidonjood), Hulpstoffen zalf: Macrogol 400, 4000 en 6000 en gezuiverd water.

## Afleveringsvormen:

Betadine desinfectiezalfgaas is verkrijgbaar in doos bevattende 5 of 50 apart verpakte wondgazen met Betadine zalf (10 x 10 cm).

## Werking:

Betadine desinfectiezalfgaas is een wondgaas met een desinfecterende (ziektekiemdodende), verzachtende zalf op vetvrije basis, waarvan het werkzamebestanddeel, povidonjood, een snelle en lang aanhoudende werking tegen bacteriën en schimmels heeft. De werking berust op geleidelijk uit deze verbinding vrijkomend jodium dat geen pijn veroorzaakt bij contact met de huid. Door de bruine kleur, dat duidt op de aanwezigheid van jodium is de plaats zichtbaar waar gedesinfecteerd is. De desinfecterende werking van Betadine zalf duurt voort zolang de bruine kleur zichtbaar is. Povidonjood is een desinfectans met een werking tegen een groot aantal micro-organismen. Ongevoeligheid van bacteriën voor Betadine is niet waargenomen.

## Verantwoordelijk voor het in de handel brengen

**MEDA**

Meda Pharma B.V.  
Postbus 167  
1180 AD Amstelveen

Licentie:  
MUNDIPHARMA, Bazel/Zwitserland

CE 0336

## Te gebruiken bij:

Het reinigen, behandelen of het voorkomen van infecties van oppervlakkige brand-, snij of schaafwonden. NB In ernstige en zwaar geïnfecteerde wonden is medische beoordeling en het gebruik van systemische antibiotica aangewezen.

## Niet te gebruiken bij:

- Pasgeboren en te vroeg geboren baby's
- Langdurig gebruik op grote huidoppervlakken bij zwangerschap en bij een overmatige schildklierwerking
- Jodiumovergevoeligheid

## Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen:

- Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Voorzichtigheid is geboden bij personen met jodiumovergevoeligheid en schildklierafwijkingen.
- Betadine desinfectiezalfgaas is niet te gebruiken ter voorkoming van tetanus.
- Niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.

## Gebruik in de zwangerschap en tijdens de borstvoeding:

Het is bekend dat jodium de placenta passeert en zo de foetus bereikt, waarbij grote hoeveelheden tot functionele stoornissen in de schildklier van de foetus kunnen leiden. Zwangere vrouwen moeten het gebruik van Betadine desinfectiezalfgaas vermijden. Omdat jodium bij voorkeur in de moedermelk wordt uitgescheiden (tot aan 50%) kan zelfs toepassing van een kleine hoeveelheid leiden tot een hoge dosis vrije jodium in de moedermelk en remming van de schildklierfunctie van de baby veroorzaken. Na toepassing van Betadine desinfectiezalfgaas dient de

borstvoeding voor tenminste 24 uur te worden onderbroken.

## Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken:

Invloed op de rijvaardigheid valt in het algemeen niet te verwachten.

## Dosering en wijze van gebruik:

Wond reinigen, de huid rondom de wond reinigen en drogen. Gaas op de wond aanbrengen. Gaas bedekken met (ademend) verband en dit met tape aan de huid hechten. Verband dagelijks wisselen. Betadine desinfectiezalfgaas niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder uw arts te raadplegen.

## Verschijselen bij en behandeling van overdosering:

Mocht een persoon onverhoopt grote hoeveelheden Betadine via de mond hebben binnen gekregen, dan bestaat de behandeling uit het laten drinken van veel water of melk en eventueel het toedienen van een laxans. Mocht u een overdosering vermoeden waarschuw dan onmiddellijk een arts.

## Bijwerkingen:

Huidirritatie kan sporadisch voorkomen. Ook bij patiënten met een bekende jodiumovergevoeligheid veroorzaakt povidonjood slechts zelden huidirritaties. Indien er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, wordt u verzocht uw arts of apotheker hiervan op de hoogte te brengen.

## Bewaring en houdbaarheid:

Op een donkere plaats en bij 15-25°C bewaren. De uiterste gebruiksdatum is vermeld op de verpakking achter "niet te gebruiken na" (maand/jaar).

augustus 2006